

Unser Sortiment zur Unkrautkontrolle im Futterbau



Ally® Tabs

Einfaches Handling zur Blacken-Einzelstockbekämpfung
in Rückenspritze: 3 Tabletten auf 10 Liter Wasser + 3 ml Farbstoff
Sobidoss: 1 Tablette auf 1 Liter Wasser + 1 ml Farbstoff



Trifolin®

Gegen Blackenkeimlinge in Kunstwiesen-Neuanlagen
oder zur Kontrolle des Hahnenfusses in etablierten Grasbeständen
Anwendung: Blackenkeimlinge: 4 l/ha, Hahnenfuss: 6 l/ha



Harmony® SX

Der Langzeitschutz gegen Blacken in etablierten Wiesen
und mit Teilwirkung gegen Hahnenfuss. Anwendung im Herbst: 45 g/ha

Trifulox®

Gegen ausgewachsene Blacken und Farne in Wiesen und Weiden
Anwendung: 4 l/ha



Pedian® SG

Bei starkem Unkrautdruck in Kunstwiesen-Neuanlagen, in Mischung mit Trifolin
Anwendung: 4 l/ha Trifolin + Pedian SG 0,8 kg/ha



Garlon® 2000

Für Einzelstockanwendung gegen Disteln, Brennnesseln, Brombeersträucher und andere Sträucher

Anwendung: 2 dl in / 10 l Wasser



Metarex® INOV

Zur Schneckenkontrolle in Kunstwiesen-Neuanlagen, insbesondere Randbehandlungen

Anwendung: 5 kg/ha. Bei langsamem Wachstum ev. wiederholen

Voraussetzungen für erfolgreichen, unkrautfreien Futterbau



Eine dichte Grasnarbe

Eine Schnitthöhe zwischen 6–9 cm verhindert die Verletzung der Grasnarbe, bzw. verhindert Neukeimung von Unkräutern (Blacken, Löwenzahn, etc.)




Blacken sind Lichtkeimer

Sie keimen in Kunstwiesen-Neuanlagen und bei verletzter Grasnarbe, verursacht durch Maschinen, Trittschäden oder Mäuse

W-6443

Stähler Produkte sind geprüfte und sichere Pflanzenschutzmittel mit einer W-Nummer



Stähler Suisse SA · Henzmannstrasse 17A · 4800 Zofingen

Telefon 062 746 80 00

www.staehler.ch · info@staehler.ch



Höchster Standard für Ökoeffektivität.
Cradle to Cradle Certified™-Druckprodukte
hergestellt durch die Vögel AG.